


P R O G R A M M E P B I	 MAROC							P R O G R A M M E P B I
	Avant Plantation	Pièges jaunes englués	Poudrage de soufre (25-50 kg/Ha)	Pièges jaunes englués	Pièges jaunes englués	Désinfection Poudrage de soufre (25-50 kg/Ha)	Désinfection Poudrage de soufre (25-50 kg/Ha)	
	Après Plantation 	1 semaine avant les introductions CHES (pymetrozine) LIMOCIDE (essence d'orange) OIKOS (Azadiracthin)	APOLLO® (clofentézine) FLECHE (abamectin) (1 semaine avant les introductions, si nécessaire)	FLECHE (abamectin)	OIKOS (Azadiracthin) CHES (pymetrozine)	-	-	
	Préventif 	ERETSURE (e) (<i>Eretmocerus eremicus</i>) and ERETSURE (m) (<i>Eretmocerus mundus</i>) 3 x 5/m ² NESISURE (t) (<i>Nesidiocoris tenuis</i>) 2 x 0.25/m ² EGGSURE= 3 x 40 g/ha, 3 semaines d'affilée		DIGSURE (i) (<i>Diglyphus isae</i>) 3 x 0.1 /m ²	APHISURE (c) (<i>Aphidius colemani</i>) Ou APHISURE (e) (<i>Aphidius ervi</i>) 0.1/m ² , jusqu'à 5 introductions	Chenilles (<i>Spodoptera</i> , <i>Heliothis</i> , <i>Plusia</i> ...) = Pièges à phéromones NESISURE (t)	-	
	Curatif 	ERETSURE (ec) and (m)	PHYTOSURE (pt) (<i>Phytoseiulus persimilis</i>) 3 x 0.6/m ²	DIGSURE (i) 0.5 /m ²			-	
	Traitements Curatifs 	OBERON® (spiromesifen) APPLAUD (buprofezine) CHES (pymetrozine) ADMIRAL (pyriproxyfen) LIMOCIDE (essence d'orange)	APOLLO® (clofentézine)	OIKOS (Azadiracthin) FLECHE (abamectin) TRIGARD (cyromazine)	PIRIMOR (pirimicarb), CHES (pymetrozine) OIKOS (Azadiracthin)	Chenilles= BT GOR (Bt), Thrips = OIKOS (Azadiracthin) , TRACER, rotenone on spots Tarsonémidés= S, OIKOS (Azadiracthin)	Botrytis, Oïdium, Fusarium, Septoria, Anthracnose = THIOPRI 70 (thiophanate-méthyle) Botrytis (resistant strains) = THIOPRI 70	
	Fin de Culture 	si nécessaire: FLECHE (abamectin) OBERON®	si nécessaire: FLECHE (abamectin) OBERON®	FLECHE (abamectin)	-	-	-	

ATTENTION : Ce document est un guide et les informations présentées ci-dessus doivent être adaptées en fonction de la situation sur le terrain et de la pression en ravageurs. Les doses et nombres d'apports pourront donc être modifiés en accord avec le technicien conseil. De plus, aucun des traitements recommandés ci-dessus ne doit être effectué sans vérifier au préalable les indications mentionnées sur l'étiquette du produit. En cas de contradiction, ce seront toujours les recommandations du détenteur d'homologation qui devront être suivies. Avant d'effectuer un traitement recommandé, il est de la responsabilité du producteur de s'assurer qu'il est autorisé pour cette culture.