

## POIVRONS

	 <b>MAROC</b>	 <b>Aleurodes</b>	 <b>Acariens</b>	 <b>Thrips</b>	 <b>Pucerons</b>	 <b>Autres ravageurs</b>	 <b>Maladies</b>
<b>Avant plantation</b>		Pièges englués jaunes		Pièges englués bleus	Pièges englués jaunes	Pièges englués jaunes	Désinfection
<b>Après plantation</b> 		CHES (pymetrozine) APPLAUD (buprofezine) ADMIRAL (pyriproxyfen) LIMOCIDE (essence d'orange)	Si nécessaire : FLECHE (abamectin)	TRACER (spinosad)	LIMOCIDE (essence d'orange)	<b>Noctuelles = BT GOR</b> ( <i>Bacillus thuringiensis</i> ),	
<b>Préventif</b> 		AMBSURE (sw) ( <i>Amblyseius swirskii</i> ) 2 x 25/m <sup>2</sup>		6 à 8 sem. après plantation et à 2 sem. d'intervalle : AMBSURE (sw) 2 x 25/m <sup>2</sup> ORISURE (l) ( <i>Orius laevigatus</i> ) 2 x 0.25/m <sup>2</sup>	APHISURE (c) ( <i>Aphidius colemani</i> ) 0.1/m <sup>2</sup> , jusqu'à 5 introductions, selon la pression en pucerons		<b>Botrytis =</b> contrôle cultural
<b>Curatif</b> 		[En cas de très forte pression : AMBSURE (sw) 2 x 50/m <sup>2</sup> ]	PHYTOSURE (p) ( <i>Phytoseiulus persimilis</i> ) 0.5/m <sup>2</sup> Répéter après 2 semaines ou si nécessaire	[En cas de très forte pression : AMBSURE (sw) 2 x 50/m <sup>2</sup> ORISURE (l) 2 x 0.5/m <sup>2</sup> ]			
<b>Traitements curatifs</b> 		OBERON® (spiromesifen) APPLAUD (buprofezine) CHES (pymetrozine) ADMIRAL (pyriproxyfen) LIMOCIDE (essence d'orange) OIKOS (Azadiracthin)	APOLLO® (clofentézine) CESAR (hexythiasox) OIKOS (Azadiracthin)	TRACER (spinosad) (attention, effets secondaires sur <i>A. swirskii</i> ) OIKOS (Azadiracthin)	PIRIMOR (pirimicarbe) CHES (pymetrozine), LIMOCIDE (essence d'orange)	<b>Acariose bronzée =</b> FLECHE (abamectin), Soufree <b>Acarien blanc = FLECHE</b> (abamectin) + APOLLO® (clofentézine)	<b>Botrytis = IPPON</b> (iprodione), <b>Oidium =</b> TIOSOL (soufre), Soufre sublimé, azoxystrobine
<b>Fin de culture</b> 		OBERON® (spiromesifen)	FLECHE (abamectin)	FLECHE (abamectin)			

**ATTENTION :** Ce document est un guide et les informations présentées ci-dessus doivent être adaptées en fonction de la situation sur le terrain et de la pression en ravageurs. Les doses et nombres d'apports pourront donc être modifiés en accord avec le technicien conseil. De plus, aucun des traitements recommandés ci-dessus ne doit être effectué sans vérifier au préalable les indications mentionnées sur l'étiquette du produit. En cas de contradiction, ce seront toujours les recommandations du détenteur d'homologation qui devront être suivies. Avant d'effectuer un traitement recommandé, il est de la responsabilité du producteur de s'assurer qu'il est autorisé pour cette culture.