

zimbor forte



ACTION

Mélange innovant d'oligo-éléments, glycine-bétaïne et mélasse de betterave à sucre, essentiels dans le développement racinaire et hormonal des plantes, favorise l'induction florale et la nouaison.

Formulation très indiquée pour fournir aux plantes les éléments zinc et bore aux stades de pré-floraison, de nouaison et du développement des fruits.

Contient de la Glycine-Bétaïne qui agit comme osmoprotecteur et véhiculant des éléments peptidiques, et des sucres réducteurs provenant d'un hydrolysé végétal qui rendent l'absorption et l'assimilation des deux nutriments plus efficaces, même dans des conditions défavorables telles que les basses températures.

RICHESSSES GARANTIES

Azote total (N)	2,5 % p/p
Azote organique (N)	1 % p/p
Azote nitrique (N)	1,5 % p/p
Potassium (K ₂ O) total	5,7 % p/p
Bore (B) total	4 % p/p
Molybdène (Mo) soluble dans l'eau	0,2 % p/p
Zinc (Zn), total	11 % p/p
Carbone organique (Corg)	22 % p/p
Matière sèche	97 % p/p

En plus des Richesses garanties, la provenance du Carbone Organique et Matière Sèche d'origine 100% Végétale, émanant des ingrédients Bétaïnes et Hydrolysés de protéines de la mélasse de Betterave Sucrière.

AVERTISSEMENTS ET STOCKAGE

Stocker à l'abri du froid en hiver, ainsi comme des températures supérieures aux 28°C. Éviter la lumière directe et les stockages prolongés. En cas de mélanges, contacter le service technique de la compagnie.

La compagnie garantit la formulation, composition et contenu. L'utilisateur final sera le responsable des dégâts causés par la non observation totale ou partielle de l'étiquette. Ne pas dépasser les doses indiquées sur les étiquettes.

DOSES ET MOMENTS D'APPLICATION

Avocatier et autres cultures tropicales et sub-tropicales

Dose: 150-200 gr par 100 litres d'eau.

Statut de la culture: Stade pré-floraison et pleine floraison. Pendant le grossissement des premiers fruits

Moments recommandés: 2 applications pendant le débournement et pleine floraison. 2 applications pendant la nouaison et grossissement.

Agrumes et Fruitières

Dose: 200 gr par 100 litres d'eau.

Statut de la culture: Débournement. Nouaison. Grossissement des fruits

Moments recommandés: Effectuer un traitement à chaque une des phases indiquées.

C. maraichères, ornementales et C.Aromatiques

Dose: 150-250 gr par 100 litres d'eau.

Statut de la culture: À partir de 3-4 feuilles

Moments recommandés: Traiter régulièrement tous les 21 jours à la dose plus basse comme entretien ou à la dose plus élevée comme correction d'états carenciels.

Oliver

Dose: 200 gr par 100 litres d'eau.

Statut de la culture: Début du débournement et pendant le durcissement du noyau

Moments recommandés: un traitement à chaque phase indiquée



ALFACHIMIE

Importateur et Distributeur: Tél. +212(0) 522 32 13 11
ALFACHIMIE: Lotissement +212(0) 675 00 01 33
Bouskoura Park, Lot 19 Ville Fax. +212(0) 522 32 12 93
Verte 20180 Bouskoura, www.alfachimie.com
Casablanca