

Calciform Si



DESCRIPTION

calciform Si est un correcteur de carences en calcium (Ca) issu de formiate de calcium avec du silicium amorphe (SiO₂) pour application foliaire et racinaire. Le calcium est un élément essentiel, notamment en ce qui concerne la qualité des fruits et du végétal, en augmentant leur fermeté, leur aspect et leur durée de conservation. L'application de calcium augmente sa concentration dans les fruits et les parties vertes, améliorant ainsi leur fermeté et leur qualité en post-récolte.

Formulation synergique de Ca + Si sources exclusives :

- Formiate de Calcium rapidement assimilable et plus mobile.
- Silicium qui renforce les tissus
- Amélioration structurelle du fruit et de la plante

calciform Si est un engrais foliaire Premium Fortifiant orienté vers la qualité. Cette association avec le Silicium a été développée pour produire une fermeté maximale des fruits, une meilleure conservation post-récolte et une plus grande résistance de la culture grâce à la technologie de calcium hautement assimilable (formiate) combiné avec du silicium bio-assimilable.

Rôle du calcium

- Améliore la fermeté et la résistance des tissus
- Augmente la qualité visuelle des fruits
- Prolonge la conservation post-récolte

Rôle du silicium

- Renforce les parois cellulaires
- Augmente la tolérance aux stress abiotiques
- Limite les pertes hydriques

RICHESSSES GARANTIES

Calcium total (CaO)	37 % p/p
Silicium (SiO ₂)	9 % p/p

AVERTISSEMENTS ET STOCKAGE

Ce produit n'est pas phytotoxique lorsqu'il est utilisé conformément aux recommandations et peut être mélangé avec la plupart des produits phytosanitaires et engrais usuels, sauf ceux à base de phosphore. Il peut augmenter le pH de la solution, il est donc recommandé de l'ajuster avant d'ajouter des produits sensibles aux conditions alcalines. stocker à l'abri du froid et des fortes chaleurs. Eviter la lumière directe et les stockages prolongés. En cas de mélanges, contacter le service technique de la société. La société garantit la formulation, composition et contenu. L'utilisateur final est seul responsable des dégâts causés par la non observation total ou partielle de l'étiquette. Ne pas dépasser les doses indiquées sur les l'étiquette.

DOSES ET STADES D'APPLICATIONS

La dose générale en application FOLIAIRE est de 0,20–0,30 % (200–300 g/hl). Son utilisation est également possible en applications racinaires à la dose de 3 à 5kg/ha.

Utiliser les doses les plus faibles sur les cultures jeunes et les doses les plus élevées sur les cultures bien développées et à forte exigence en calcium, ce qui correspond généralement au stade de fructification.

MYRTILLE, FRAMBOISE, FRAISE ET AUTRES FRUITS ROUGES: Du début de floraison jusqu'à la pré-récolte. Améliore la fermeté, l'aspect et la conservation (post-récolte) tout en évitant les pertes de poids.

POMMIER: À partir de la floraison, traiter tous les 10 à 15 jours (3–4 traitements). Bitter Pit : traiter durant les mois de juillet-août précédant la récolte.

PÊCHER, NECTARINIER: Pour prévenir l'éclatement, améliorer la consistance du fruit et la qualité de conservation post-récolte. Appliquer pendant la croissance du fruit jusqu'avant la récolte.

AGRUMES: À partir de la chute des pétales, pendant l'été et jusqu'à la récolte des fruits afin d'éviter la fissuration, les malformations, le "bouffage" (séparation de l'écorce) et le "creasing" (altérations de la peau). Appliquer de juin jusqu'avant la récolte. DOSE de 200 Gr/Hl (200 grammes par 100 litres d'eau)

RAISIN DE TABLE: Appliquer à la fermeture de la grappe, en pleine étape de grossissement des baies et au début de la véraison.

TOMATE, POIVRON et AUBERGINE: Pour prévenir les carences responsables de physiopathies de la peau des fruits, apporter fermeté et qualité. Appliquer dès la formation des bouquets.

CONCOMBRE, COURGETTE, MELON et PASTÈQUE: Pour prévenir les carences responsables de physiopathies de la peau des fruits, améliorer la fermeté, la qualité et le rendement. Applications de préférence dès les premières phases de développement de la culture.

AVOCATIER: À partir de la chute des pétales, pendant l'été et jusqu'à la récolte des fruits afin de garantir la fermeté, la résistance mécanique et la conservation des fruits. 2 applications à la phase de chute de pétales et nouaison des fruits - 2 applications pendant la phase de grossissement des fruits

POMME DE TERRE ET BETERAVE À SUCRE: Améliore en général la fermeté, la qualité et la conservation.



Importé et distribué par la société:

ALFACHIMIE
Lot 19, Bouskoura park, ville verte,
Bouskoura, Maroc

